

Dr. Paulo Loureiro de Arambuja

CARDIOLOGIA

PASSO FUNDO — R. G. DO SUL

III

Passo Fundo, 20 de Maio de 1957

Exmo. Sr. João Damiani

O estudo radiológico e clínico efetuado nesta data, revelou uma cardiopatia hipertensiva, com dilatação dinâmica da aorta e discreta insuficiência cardíaca.

No entanto com tratamento adequado e certa restrição alimentar, é possível uma melhora no estado cardio-circulatório que permita uma vida com certa atividade física.

Observe o seguinte plano de tratamento durante 30 dias:

Alimentação:

Diminuir a quantidade de sal no tempero dos alimentos e diminuir também a quantidade de alimentos a fim de não continuar engordando.

Atividade:

Não mobilizar objetos pesados, não subir escadas depressa, não alterar-se no curso de conversações, sobretudo, não chegar cansado ao fim do dia; para isso, deitar-se cedo e repousar uma hora após o almoço.

Medicação:

Tomar nos 3 primeiros dias, de 8/8 horas, 1 comprimido de Digital Lederle, do quarto dia em diante e indefinidamente, 1 comprimido após o café da manhã.

Aminofilina composta Wander em comprimidos, tomar 4 ao dia, sendo o último antes de deitar-se.

Reserpina Enila 0.25 em comprimidos, tomar 4 ao dia, após as refeições.

Fazer 1 empola de Sterandryl 25, 2 vezes por semana.

Fazer 1 empola de Gortulina no musculo pela manhã, de 4/4 dias.

Esperando que cumpra as presentes indicações, volte para controle, dentro de 30 dias.

Atenciosamente.



DR. PAULO LOUREIRO DE AZAMBUJA

Membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade
Internacional de Cardiologia

Estágio na Clínica do Prof. Pedro Cossio em B. Ayres

DOENÇAS DO CORAÇÃO — CLÍNICA MÉDICA

Eletrocardiografia — Metabologia — Radiologia

Cons. Bento Gonçalves, 438 — Fone 148

Res. Gal. Canabarro, 943 — Fone 290

PASSO FUNDO — R. G. Sul

DIGITAL

1º, 2º, 3º dias Tomar
1 comprimido 8/8 horas
do 4º dia em diante
Tomar 1 comprimido
após café da manhã.

CLOTRIDE

Tomar 1/2 comprimido
3 vezes ao dia

RESERPINA

TOMAR 4 Comprimi-
dos ao dia
